Exercices. Tome II : série II

Numéro d'inventaire : 2016.90.26
Type de document : travail d'élève
Période de création : 1er quart 20e siècle
Date de création : 1916 (entre) / 1917 (et)
Matériau(x) et technique(s) : papier
Description : Cahier cousu avec une couverture cartonnée orange portant une étiquette de titre. Réglure double ligne 8 mm avec une marge rouge. MS encre noire.
Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17,2 cm
Mots-clés : Calcul et mathématiques
Filière : Supérieure
Autres descriptions : Langue : français
Nombre de pages : Non paginé
Commentaire pagination : 100 p.
ill.
Lieux : Paris

2e cahier 1916-1917. [Voir à la fin des questions concernant le cours d'algèbre (début)]

$$\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

Coef. 7 janv 17.

Lorsque vous avez à intégrer 1 exp telle que $\frac{P}{Q\sqrt{1-x^2}}$ où P et Q sont des poly, Q n'ayant que des rac simples vous pouvez simpl l'intégrer déc $\frac{P}{Q}$ en éléments simples. Il y a des cas où ça serait plus compliqué de faire comme ça. Mais en général c'est la meilleure méthode. Ap la ici

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{4-x^2} = \frac{A}{2-x} + \frac{B}{2+x}, \quad A = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{4}$$

$I = \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{\ }}$ + une intég analogue $\frac{1}{4}\int_0^1 \frac{dx}{(2+x)\sqrt{\ }}$

Je vais me simpl rendre en écrivant $1-\frac{x}{2}$ au lieu de $2-x$ et en mett $\frac{1}{8}$ en fact

$$I = \frac{1}{8}\int_0^1 \frac{dx}{(1-\frac{x}{2})\sqrt{\ }} + \frac{1}{8}\int_0^1 \frac{dx}{(1+\frac{x}{2})\sqrt{\ }}$$

Ce sont des intégrales classiques qu'on rencontre fréq.

Si on fait $x = \cos\theta$, θ entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, elles se transforment alors-ci : la première

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{-\sin\theta\, d\theta}{(1-\frac{\cos\theta}{2})\sin\theta} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1-\frac{\cos\theta}{2}}$$

C'est du type général $\int \frac{d\theta}{1+e\cos\theta}$ où $|e|<1$.

Sa valeur peut s'exp de plus façons, par ex par la fct

$$\frac{2}{\sqrt{1-e^2}} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{1-e}{1+e}}\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\right)$$

Ici $e = \frac{-1}{2}$. Donc nous allons avoir

$$\frac{2}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}}\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} \operatorname{arctg}\left(\sqrt{3}\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\right)$$

Nous avons à div par 8 et à ajouter 1 intégrale analogue qui ne diff de la 1e que par le signe de e.

Ce sera donc $\frac{2}{8\sqrt{1-\frac{1}{4}}} \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\right)$. Eh bien, il faut faire la somme de ces 2 intégrales et prendre la var