Histoire naturelle

Numéro d'inventaire : 2015.8.3147
Auteur(s) : Jeanne Roques
Type de document : travail d'élève
Période de création : 2e quart 20e siècle
Date de création : 1931 (entre) / 1932 (et)
Matériau(x) et technique(s) : papier, papier cartonné
Description : Cahier cousu à couverture bleue et dos noir. Sur la 1ère de couv. : illustration représentant un globe terrestre, une longue-vue, des livres, des instruments de mesure puis "Ecole normale d'institutrices d'Albi" imprimés à l'encre noire. Réglure séyès, encre noire, crayon de bois, crayon de couleur bleu, vert, marron, rouge, jaune.
Mesures : hauteur : 21 cm ; largeur : 13,5 cm
Notes : Sujets traités : les champignons, étude de la cellule, coupe dans la pelure d'un oignon, racine d'iris, tableau chronologique des terrains sédimentaires, calcaire de Blaye, d'Albi, grès, schiste, quartz, granit, etc. Schémas et dessins relatifs aux sujets traités. Élève en 1ère année d'Ecole Normale d'institutrices.
Mots-clés : Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)
Filière : École normale d'instituteur et d'institutrice
Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé
Commentaire pagination : 41 p. manuscrites sur 100 p.
Langue : Français
Lieux : Albi

Année 1931-32

Histoire Naturelle

Jeanne Roques
Ire année

Russule émétique

I Genre russule
Champignons charnus à chapeau peu élevé souvent déprimé au centre - Pied généralement court - jamais de lait (dif. avec genre lactaire
En général couleur vive rouge orangé etc
Spores blanches

II Variétés : russule émétique
chapeau rouge ~~brique~~ vif ou foncé se décolorant facilement et devenant par endroits ou même en entier jaunâtre ou blanc
4 à 10 cm
Pied blanc souvent tacheté de rose ou de rouge Feuillets blancs - chair blanche rougeâtre sous l'épiderme qui est très facile à détacher, saveur très poivrée commune ds les bois : été, automne.
Très vénéneuse

Hypholome en touffes.

I Genre hypholome
Ds le jeune âge un anneau formé de filaments grêles et assez espacés (cortine) rattachent le pied au bord du chapeau
Peut laisser traces sur le pied ou le bord du chapeau mais n'est pas toujours visible ds les échantillons agés spores violacées

II Espèces : hypholome en touffes
chapeau jaune plus pâle au bord
4-6 cm
pied creux souvent flexueux ou peu recourbé jaunâtre parfois roux ou orangé
lames jaunes verdâtre puis vert sale
chair très amère - espèce commune en grosses touffes sur vieilles souches, troncs d'arbre
Automne

Suspecte

Cortinaires

I Genre cortinaire

Très grand nombre d'espèces faciles à reconnaître, ont un anneau comme les hyphtolomes : cortine formé de filaments grêles lâchement unis entre eux ; ressemble un peu à une toile d'araignée ; ds le jeune âge unit le pied au chapeau. Plus tard débris autour du pied ou du chapeau

Feuillets de couleur variée quand le champignon est jeune (jaune, violacé, roux) devient brun foncé

Grd nombre de cortinaires visqueux

Très peu d'espèces comestibles

Spores jaune d'ocre

II Espèce cortinaire anomal

Chapeau de couleurs diverses suivant les variétés : jaune pâle, bleu, violet rose gris brun roux - nombreuses variétés. Commune ds les bois, surtout de hêtres