

## Cours d'agriculture spéciale

**Numéro d'inventaire** : 2015.8.6252

**Auteur(s)** : Armand Hess

**Type de document** : travail d'élève

**Période de création** : 1er quart 20e siècle

**Date de création** : 1922 - 1923

**Matériau(x) et technique(s)** : papier | encre, | encre, | encre

**Description** : Cahier en papier à la couverture cartonnée rose. Reliure piquée agrafée et collée sur un dos noir. Régure 4x4. L'ensemble est écrit à l'encre noire, avec des mentions à l'encre verte (pour les dates) et à l'encre rouge pour le soulignement. Quelques schémas réalisés à l'encre noire, et des vignettes en papier imprimées à l'encre noire collées sur les pages.

**Mesures** : hauteur : 22 cm ; largeur : 17 cm

**Notes** : Cahier de cours d'Agriculture spéciale appartenant à Armand Hess, scolarisé en 3e année à l'Ecole d'Agriculture du Rhône (Ecully) pour l'année 1922-1923 (du 11/12/1922 au 31/05/1923, les dates sont mentionnées dans la marge à l'encre verte). L'ensemble consiste en un cours sur la manière de cultiver certains légumes et certaines plantes. Chaque leçon étudie une plante particulière, et est souvent illustrée par une vignette imprimée à l'encre noire représentant le légume en question : -Culture des plantes fourragères : prairies naturelles, temporaires, artificielles, luzerne, trèfle, sainfoin, fourrage. -Céréales fourragères -Récolte et conservation des fourrages. -Culture des plantes sarclées : pomme de terre, topinambour, betterave, carotte, panais, navets, rutabaga, choux fourragers. - Plantes industrielles : textiles, oléagineuses, tinctoriales, à parfum.

**Mots-clés** : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

**Lieu(x) de création** : Ecully

**Utilisation / destination** : matériel scolaire

**Autres descriptions** : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 226 p.

**Lieux** : Ecully







Hess Armand

---

3<sup>m</sup> Année

---

Cours  
d'  
Agriculture (suite)

---

Lec M<sup>re</sup> Raymond



dans nos régions comme dans le nord du 10 avril au  
10 mai. Néanmoins à la terre si sèche, le minirégion  
est préférable. La betterave étant déjà d'une certaine  
rigueur avant l'arrivée des pluies et la récolte est  
un peu avancée. On fera bien d'échelonner la  
semis pour mieux répartir les gains d'entretien. Enfin,  
pour toutes les bêtes, on fait toujours la graine dans  
de l'eau ou des purins dilués d'eau. Il ne doit  
pas être prolongé.

On aime rarement en poquets, mais le plus souvent en lignes continues à la main. On en ramasse souvent de 20 à 30 kg à l'ha. On se rappelle plus en ligne avec écartes que jadis qui formaient des sillons très volumineux, mais pauvres et très aqueux. On rapproche les lignes et les pieds sur la ligne et l'écartement dépendra des sol et de la variété. En moyenne, il sera de 40 à 45 cm entre les lignes et de 20 à 35 cm de largeur. Les graines doivent être très peu couverts de terre, si son ensemencement avec les lignes coulage met maintenant contact la graine avec l'humidité du sol.

Culture par repiquage

Le service aux places est le + employé. Mais, dans le service de subsist. O'Quinn, l'espionnage est assez répandu, mais on peut remarquer que ceux qui dominent un peu humides. Le service est fait en superviseur, en Borne distants de 15 ou 20 ans.

Lorsque les betteraves meurent au collet la grosseur  
 du petit doigt, on les arrache de la pépinière pour les  
 transplanter en plein champ, préparés pour la racine  
 et rayonner à l'avance. L'opération a fait par  
 un temps court et pluvieux en mai-juin, avant  
 de repiquer, on les habille, c'est à dire on étend au  
 centre une partie du virant de la racine et 3 de  
 feuill. Parfois on trempe les racines dans une solution  
 d'eau et de purin ou de bierre de sacche qui entoure la  
 vitalité de la racine. On plante au plastron en ayant  
 soin de ne pas replier la racine, on n'entour pas  
 le collet et on comprime la terre contre les jeunes plants  
 Il a fait aussi à la hancue

25. living la  
25. aut 1923

## Soins d'entretien

La graine tene en moyenne de 11 au 13 jours  
de la semaille et on peut l'attacher par la plume  
formant une croûte, si opposément à la partie finie de  
cotyledons, il est bon de la briser. Après le lavage si la  
terre est trop légère le temps en anhydrosol est  
indiqué. Les plants ayant lui a pratiqué le 1. hère  
de la terre dans elle ai souvent beaucoup sur les  
mains de la culture

Le 1<sup>er</sup> bûche on fait après le démaillage et on  
profond que 2 1/2". On jette, 3 ou 4 bûches ont  
rien rien pour attendre la mort en la plante  
pourvu permettre le bûche à la terre  
L'he