

Aviculture, laiterie

Numéro d'inventaire : 2015.8.6260

Auteur(s) : Monique Decosne

Type de document : travail d'élève

Matériau(x) et technique(s) : papier | encre bleue, | crayon Conté

Description : Cahier en papier, à la couverture en papier fort rose, recouvert d'un protège-cahier en papier kraft. Reliure brochée au fil. Réglure Séyès. L'ensemble est écrit à l'encre bleue, avec l'utilisation du crayon à papier pour les quelques illustrations et schémas.

Mesures : hauteur : 22,5 cm ; largeur : 17 cm

Notes : Cahier de cours d'aviculture et de laiterie appartenant à Monique Decosne, sans mention de date. L'ensemble consiste d'abord en un cours sur l'élevage des gallinacées : 1. Définition 2. l'oeuf 3. l'incubation 4. alimentation 5. engraissement des volailles 6. méthodes de sélection 7. le poulailler Quelques rares schémas réalisés au crayon à papier viennent illustrer la leçon. Ensuite, à partir du milieu du cahier commence le cours de laiterie : 1. le lait 2. la traite 3. les ferments du lait 4. les fromages 5. l'écémage

Mots-clés : Enseignement de l'agriculture (y compris les métiers de la pêche)

Lieu(x) de création : Is-sur-Tille

Utilisation / destination : matériel scolaire

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 32 p.

Lieux : Is-sur-Tille



Permet d'obtenir un assez grand nombre de poussins et a se tenir
pendant toute la période de l'année.

Inconvénients : elle nécessite un matériel assez coûteux.

Alimentation du poussin

Les poussins doivent jeûner de 24 à 36 heures après la sortie de la
couveuse. Le 1^{er} repas sera des graines des fleurs, du chou, de
la pulvérisée, du pain, raisin épluché, des grains concassés.

Donner aussi de la verdure : herbes, salades.

Jeûne à petit jeûne donner des graines et à 1 mois donner la
nourriture des adultes.

Élevage des adultes

Le matin un repas composé de grains pelés le soir 1 repas de
grains (avoine, maïs, sarrasin), donner également de la verdure
(herbes, salades), la partie verte des légumes donner également de
l'avoine ou de l'orge germée. Les pondueuses et les reproducteurs
pourront avoir 3 repas par jour.

Donner des matières minérales sous forme de poudre calcaire
de coquilles d'huîtres, de sels marins.

L'engraissement des volailles

Rôle de l'engraissement

Il permet d'obtenir des sujets plus appréciés sur les marchés
et désignés sous le nom de volaille frite ou 1^{re} frite quand elles
sont jeunes.

Conditions d'un bon engraissement.

1. Donner une nourriture riche en graisse et en 1^{re} de 6.

2. L'engraissement doit être bien supporté par la bête.

3. Il doit augmenter la finesse et la douceur de la chair
qui sera blanc rose ou jaune mais jamais décolorée.

4. L'engraissement se fera sur de poulottes ou des jeu-
nes coqs âgés de 3 à 4 mois.

Engraissement à l'engrais

Les poulottes sont mises dans des cages en planches

et élevées à 30 cm au dessus du sol, le devant, le plan
cher forme des barreaux, le dessus forme une toiture et per-
met d'introduire les oiseaux. On peut isoler complètement
ceux-ci ou les mélanger par groupe de 4 ou 5. Donner 4 repas
par jour et peu d'eau. L'engraissement dure de 2 à 4 se-
maines.

Engraissement par patrons

Il est surtout employé en Bresse en France. Il consiste à
donner des patrons aux volailles, contenus dans une coque
d'osier serrée. Un patron a la forme d'une olive et mesure
6 cm de long on aura à donner 12 à 15 patrons par jour. Ils
sont composés de faine de sarrasin, faine d'orge, faine d'a-
voine. L'engraissement dure 4 à 6 semaines.

Engraissement par gavage

Il consiste à introduire dans le gosier de l'animal une pa-
tie humide et liquide. Les oiseaux sont en granielle et pavé