VIH / sida : après un risque...

Numéro d'inventaire : 2019.37.39
Auteur(s) : Aides (France)
L Marsault
S Blot
Type de document : imprimé divers
Inscriptions :
• titre : VIH / sida : après un risque...(couverture)
• logo : Aides(couverture)
Matériau(x) et technique(s) : papier
Description : Plaquette en deux volets, illustrée
Mesures : hauteur : 14,9 cm
largeur : 10,5 cm
Notes : Plaquette de présentation des mesures à prendre après avoir pris un risque lors d'une relation sexuelle (traitements d'urgence et dépistage)
Mots-clés : Éducation à la santé et à la sexualité
Historique : Ce document fait partie de la collecte LGBT initiée en 2018 et poursuivie en 2019.
Représentations : figure : homme
Autres descriptions : Langue : français
Voir aussi : http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=notice_display&id=34178

VIH/sida :
après un risque...
Contamination par le VIH :
quels sont les symptômes ?
Plus de la moitié des personnes contaminées par le VIH ont **des symptômes qui apparaissent une à huit semaines après la contamination :**
• impression d'être grippé : fièvre, mal de gorge, ganglions au cou, sous les bras, fatigue, courbatures, mal de tête... ;
• boutons ou plaques rouges sur le torse, le cou, petites plaies ou irritations sur le sexe, l'anus, dans la bouche.
Ces symptômes peuvent diminuer ou disparaître ensuite. Mais on peut aussi ne pas avoir de symptôme du tout après une contamination...
Que faire si j'ai un doute ?
• **Un dépistage VIH et infections sexuellement transmissibles,** tout de suite.
• **Protéger toute relation sexuelle,** y compris le fait de sucer ou de se faire sucer, même sans éjaculation.
AIDES