

Cours élémentaire d'hygiène : Enseignement secondaire : Écoles normales primaires : Écoles primaires supérieures : Écoles pratiques d'industries

Numéro d'inventaire : 1984.00831.1

Auteur(s) : Ephrem Aubert

A. Lapreste

Type de document : livre scolaire

Éditeur : André-Guédon (F. E.) (Paris)

Mention d'édition : 10ème édition

Date de création : 1905

Matériau(x) et technique(s) : papier, carton

Description : Relié carton/papier (blanc cassé) et toile (noire). Plats imprimés. Dos toilé avec étiquette papier : Aubert et Lapresté/ cours élémentaire d'hygiène.

Mesures : hauteur : 18 cm ; largeur : 11,5 cm

Notes : Rédigé conformément aux programmes officiels des écoles normales primaires du 10 janvier 1889, de l'enseignement secondaire des 10 juin 1891, 31 janvier et 15 février 1892, de l'enseignement primaire supérieur du 21 janvier 1893 et des écoles pratiques d'industrie.

Mots-clés : Morale (y compris morale corporelle : hygiène)


Filière : Lycée et collège classique et moderne


Niveau : Post-élémentaire

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 252

ill.





§ 10. — RAGE

La rage¹ est une maladie transmissible qui ne naît jamais spontanément chez l'homme, mais qui lui est communiquée par la morsure ou les lèchements du chien enragé, du chat plus rarement et quelquefois du loup. Le bœuf, le cheval, le mouton, le porc et le renard peuvent aussi contracter la rage.

Caractères de la rage. — Il faut bien connaître les symptômes de la rage pour prendre sans retard les mesures de préservation indispensables.

1. Instruction sur les soins à donner aux personnes mordues par les animaux atteints ou suspects de rage.

Lorsqu'une personne aura été mordue par un animal enragé ou suspect de rage, on devra *faire saigner la plaie, la laver et la cautériser*.

I. — Il faut *immédiatement*, par des pressions suffisantes, *faire saigner* les morsures les plus profondes comme les plus légères, et les *laver* à grande eau, avec un jet d'eau, si cela est possible, ou tout autre liquide (de l'urine même), jusqu'au moment de la *cautérisation*. On placera immédiatement, toutes les fois que la situation de la morsure le permet, une ligature *au-dessus* de la plaie, au moyen du premier objet venu, un mouchoir bien serré, afin d'entraver l'absorption du virus.