
Entrée dans les centres de PEGC

Numéro d'inventaire : 2024.0.161

Auteur(s) : Annette Nobile

Type de document : travail d'élève

Période de création : 4e quart 20e siècle

Date de création : 1974

Matériaux et technique(s) : papier | encre noire

Description : Une copie double d'examen à simple lignage avec partie supérieure à massicoter.

Mesures : hauteur : 31,1 cm

largeur : 24 cm

Notes : Il s'agit de la copie d'examen au concours d'entrée dans les centres PEGC (Professeur d'Enseignement Général de Collège), de la candidate Annette Nobile (née Laurore). La spécialité de l'élève est Sciences naturelles-Sciences-physiques, section 4 (probablement en bac D). L'épreuve est une composition de chimie. Le centre d'examen est à la préfecture de Rouen. L'épreuve se déroule en mai 1974. La note obtenue est de 17/20, la moyenne du lot de copies dont elle est issue est de 08,8/20.

Mots-clés : Compositions et copies d'examens

Formation initiale et continue des maîtres (y compris conférences pédagogiques), post-élémentaire

Lieu(x) de création : Rouen

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination : 4 p.

Nom et Prénom : NOBILE Annette née LAURORE

N° d'inscription : 257

Centre d'examen : Préfecture

collez ici après avoir rempli l'en-tête

Visa du Correcteur

Examen : Entrée dans les centres de PEGC Session : Mai 76

Spécialité ou Série : Section 4 (Sciences Naturelles - Sciences physiques)

Si votre composition
comporte plusieurs
feuillets,

numérotez-les 11

Note :

17-

20

Composition de Sciences physiques -

- chimie -

Calculons le volume V_2 de 1 mole d'eau
à $100^\circ\text{C} = 373^\circ\text{K}$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$V_2 = \frac{P_1}{P_2} \times V_1 \times \frac{T_2}{T_1}$$

$P_1 = P_2 = \text{pression normale}$

$$T_2 = 273^\circ\text{K} + 100^\circ\text{C} = 373^\circ\text{K}$$


$$T_1 = 273^\circ\text{K}$$

$$V_2 = 22,4 \times \frac{373}{273} = \underline{\underline{30,6 \text{ l}}}$$

Calculons le nombre de moles dans 990 g.

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mole} & \rightarrow & 17 \text{ g} \\ x \text{ moles} & & 990 \text{ g} \end{array}$$

N.B. - Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance de la copie.



$$x = \frac{990}{18} = 55 \text{ moles}$$

Calculons le volume occupé par 55 moles

$$30,6 \times 55 = 1683 \text{ litres}$$

Calculons ΔU

$$\Delta U = 1683 - 0,990 \approx -1682 \text{ litres}$$

$$W = -P \Delta V$$

$$W = -1 \times 1682 = -1682 \text{ J. at } / g$$

$$1 \text{ J. at } = 4,18 \text{ cal.}$$

$$W = -40738 \text{ cal}$$



$$W = -40738 \text{ kcal.}$$

$$1 \text{ cal. } = 4,18 \text{ J.}$$

$$W = -40738 \times 4,18 \text{ J.}$$

$$W = -170286 \text{ J.}$$

$$W = -170286 \text{ kJ. } / s$$




$t=0$	a	a	0	0
$t \neq 0$	$\frac{2}{3}a$	$\frac{2}{3}a$	$\frac{1}{3}a$	$\frac{1}{3}a$

$$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}] \times [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \times [\text{H}_2\text{O}]}$$

$$K_c = \frac{\frac{1}{3}a \times \frac{1}{3}a}{\frac{2}{3}a \times \frac{2}{3}a} = \frac{1}{9} \times \frac{9}{4}$$

$$K_c = \frac{1}{4}$$

III liaison de covalente.



densité électronique

lorsque la densité électronique passe par un minimum non nul, il y a



Exportar los artículos del museo

Subtítulo del PDF
