PEGC

Numéro d'inventaire : 2024.0.164
Auteur(s) : Patricia Le Duc
Type de document : travail d'élève
Période de création : 4e quart 20e siècle
Date de création : 1975
Matériau(x) et technique(s) : papier | encre bleue
Description : Quatre copies doubles d'examen à simple lignage avec partie supérieure à massicoter.
Mesures : hauteur : 31,1 cm
largeur : 24 cm
Notes : Il s'agit de la copie d'examen au concours d'entrée dans les centres PEGC (Professeur d'Enseignement Général de Collège), de la candidate Patricia Le Duc. La spécialité de l'élève est Mathématiques-Sciences-physiques, section 3 (probablement en bac C). L'épreuve est une composition de Mathématiques. Le centre d'examen est à la préfecture de Rouen. L'épreuve se déroule en mai 1975. La note obtenue est de 18/20, la moyenne du lot de copies dont elle est issue est de 07/20.
Mots-clés : Compositions et copies d'examens
Formation initiale et continue des maîtres (y compris conférences pédagogiques), post-élémentaire
Lieu(x) de création : Rouen
Autres descriptions : Langue : Français
Nombre de pages : Non paginé
Commentaire pagination : 16 p.

Nom et Prénom : LEDUC Patricia

N° d'inscription : 199 Centre d'examen : Rouen

collez ici après avoir rempli l'en-tête

Visa du Correcteur

Note : 18 / 20

Examen : PEGC Session : 1975

Spécialité ou Série : Math Physique

Si votre composition comporte plusieurs feuilles. numérotez-les 1 /

Composition de Math

1er problème

$(E, +, \times)$ est vect de dimension finie sur $\mathbb{R}$

f endomorphisme : $E \to E$

$f \circ f = -1_E$

$\mathbb{C} \times E \xrightarrow{f} E$

$(a+ib, x) \to ax - bf(x)$.

1ère partie

a) $(E, +, *)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$

— $(E, +, \times)$ est sur $\mathbb{R}$

$\Rightarrow$ $(E, +)$ groupe additif commutatif

— $\forall a, \forall b \in \mathbb{R}, \forall x \in E$ $(a+b)x = ax + bx$.

$a(bx) = (ab)x$.

$\forall a \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in E$ $a(x+y) = ax + ay$

$1 \times x = 1$ 1 el neutre pour la loi $\times$.

de ceci on tire

— $(E, +)$ groupe commutatif additif

— il reste à montrer 4 relations.

$\forall z \in \mathbb{C}, \forall x \in E, \forall y \in E$ $z_1 * (x+y) = z_1 * x + z_1 * y$

$z_1 * (z_2 * x) = (z_1 z_2) * x$

$\forall z_1 \in \mathbb{C}, z_2 \in \mathbb{C}, \forall x \in E$ $(z_1 + z_2) * x = z_1 * x + z_2 * x$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $1 * x = x$ 1 el neutre de $\mathbb{C}$

N.B. - Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance de la copie.

[redacted]

- $\forall z \in \mathbb{C}$ ~~$\forall z_1 \in \mathbb{C}, z_2 \in$~~ $\forall x \in E, \forall y \in E$.

$z = a + ib \quad a \in \mathbb{R} \quad b \in \mathbb{R}$,

$z * (x+y) = (a+ib) * (x+y) = a(x+y) - b f(x+y)$
$= a(x+y) - b[f(x) + f(y)]$
car f linéaire

de plus $a, b \in \mathbb{R}$, $x \in E$, $y \in E$
$f(x) \in E$, $f(y) \in E$ car f end de $E \to E$

donc $a(x+y) = ax + ay$
$b[f(x) + f(y)] = b f(x) + b f(y)$.

$z * (x+y) = ax + ay - [b f(x) + b f(y)]$
$= ax + \cancel{b f(x)} + ay - b f(x) - b f(y)$
$= ax - b f(x) + ay - b f(y)$.

d'après les propriétés de E ev sur $\mathbb{R}$

ex donc $z * (x+y) = z * x + z * y$.

- $\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C} \quad \forall x \in E$

$(z_1 + z_2) * x = (a + ib + a' + ib') * x$.
$= [(a + a') i + (b + b') i] * x$

$= (a + a') x - (b + b') f(x)$
$= a x + a' x - [b f(x) + b' f(x)]$ car f linéaire ev sur $\mathbb{R}$
$= ax + a'x - b f(x) - b' f(x)$
$= ax - b f(x) + a'x - b' f(x)$
$= z_1 * x + z_2 * x$.

propriété de E

ex

- dans $\mathbb{C}$ element neutre $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$
$= 1 + 0b$.

donc $\forall$ ~~$z \in$~~ $x \in E$

[redacted]

$1 * x = 1x - 0f(x) = 1 \times x = x$.

– $\forall z_1 \in \mathbb{C}, \forall z_2 \in \mathbb{C}, \forall x \in E$

$z_1 * (z_2 * x) = (a+ib) * [(a'+ib') * x]$

$= (a+ib) * [a'x - b'f(x)]$

$= a[a'x - b'f(x)] - b[f(a'x - b'f(x))]$

$= aa'x - ab'f(x) - b[f(a'x) - f[b'f(x)]]$

$= aa'x - ab'f(x) - b[f(a'x) - b'f[f(x)]]$ car. f linéaire

$= aa'x - ab'f(x) - b[f(a'x) - b'f \circ f(x)]$

$= aa'x - ab'f(x) - b[f(a'x) + b'x]$ propriété de Eev sur $\mathbb{R}$

$= aa'x - ab'f(x) - bf(a'x) - bb'x$

$= aa'x - ab'f(x) - ba'f(x) - bb'x$

$= aa'x - (ab' + ba')f(x)$

or $(z_1 \times z_2) * x) = [(a+ib)(a'+ib')] * x$

$= [aa' - bb' + (ab' + a'b)i] \times x$

$= (aa' - bb')(x) - (b'a + a'b)f(x)$.

donc $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \forall x \in E$, $z_1 * (z_2 * x) = (z_1 z_2) * (x)$