
Physique générale

Numéro d'inventaire : 2025.0.102

Auteur(s) : Michel Quellier

Type de document : travail d'élève

Imprimeur : "Ecole Centrale des Arts & Manufactures"

Période de création : 3e quart 20e siècle

Date de création : 1958-1959

Matériau(x) et technique(s) : papier vélin | plume de métal

Description : Cahier à couverture cartonnée vert marbré et à dos toilé noir. Reliure cousue. Gardes en papier épais vert. Réglure 8 x 8 mm sans interlignes et sans marge.

Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17 cm

Notes : Il s'agit du premier des deux cahiers de Physique générale de Michel Quellier, élève centralien, à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, rue Montgolfier à Paris (3e arrondissement), durant sa première année de 1958 à 1959. Le nom du professeur est renseigné : M. Bastien.

Contenu 1ère partie : La matière sous son aspect corpusculaire I La matière dans ses manifestations à notre échelle A) Etat gazeux ; B) Etat liquide ; C) Etat solide ; D)

Phénomènes interfaciaux : Tension superficielle, Absorption II Constitution de la matière A)

Electrons ; B) Noyau ; C) Applications des phénomènes d'émission électronique 2ème partie :

Vibrations et ondes A) Etude des mouvements périodiques B) Etude de la propagation des

ondes planes dans les milieux isotropes 3ème partie : La matière sous son aspect ondulatoire et énergétique A) Energie radiante et théorie des quanta B) Spectroscopie et minéraux d'énergie de l'atome D) Rayons X

Mots-clés : Physique (post-élémentaire et supérieur)


Lieu(x) de création : Paris

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination : 254 p. dont 242 p. manuscrites

Objets associés : 2025.0.101



A - Etat gazeux

1° Théorie cinétique des gaz

Données générales dans l'expérience

Gaz Pesants - Occupent tout le volume mis à la disposition - Ne s'opposent pas aux déformations lentes à vol. cst.
Compressibles mais résistent aux efforts de compression -
Deux gaz de nature $\neq$ en communication diffusent l'un dans l'autre $\rightarrow$ mélange homogène


Modèle représentatif d'un gaz

Gaz formés par foule de particules très petites, pesantes se déplacent, lorsqu'elles se choquent en ligne droite avec elles les direct. et vol. de vitesse pour l'ensemble du gaz. Particules se heurtent entre elles et heurtent les parois avec de brusques changements de direction et ce sont les chocs sur les parois qui créent l'effet de pression

Bernoulli 1739

Maxwell - Boltzmann (1859) ont établi théorie cinétique.

On pensait que les chocs $\approx$ chocs entre boules de billard, en fait plus compliqué.



Il y a interaction entre le champ de forces autour de la particule et champ de force autour de la paroi par absorption
A quitte la paroi -
A quitte la paroi par agitation therm.

Nous supposons les particules très petites, sphériques, toutes de même masse (1 seul gaz). Volume total occupé par particules négligeable devant vol. du récipient.

Particules: Molecules H_2 N_2 CO_2 Temp. ordinaire
Atomes gaz ou vap. métal, à h^{tes} temp.

Bases expérimentales de la théorie cinétique


Confirmation expérimentale des études Bernoulli, Maxwell postérieures aux théories

1/ En absence de choc, les particules se déplacent en ligne droite.

2/ Ce sont les chocs de ces particules sur les parois qui créent l'effet de pression.

1) Expérience Dünker (1911), Stern (1920)

• Dünker



Vide très poussé 10^{-5} mm de Hg

Na métallique, 2 diaphragmes D_1 et D_2

Chauffer Na ↑

Tache sombre en E (en ligne droite avec D_1 et D_2)

Du fait de la pression résiduelle très faible dans tube chocs entre les atomes Na sont rares. Propagation en ligne droite. On a créé un faisceau atomique

• Stern

