

Histoire naturelle

Numéro d'inventaire : 2015.8.3147

Auteur(s) : Jeanne Roques

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e quart 20e siècle

Date de création : 1931 (entre) / 1932 (et)

Matériau(x) et technique(s) : papier, papier cartonné

Description : Cahier cousu à couverture bleue et dos noir. Sur la 1ère de couv. : illustration représentant un globe terrestre, une longue-vue, des livres, des instruments de mesure puis "Ecole normale d'institutrices d'Albi" imprimés à l'encre noire. Réglure sèyès, encre noire, crayon de bois, crayon de couleur bleu, vert, marron, rouge, jaune.

Mesures : hauteur : 21 cm ; largeur : 13,5 cm

Notes : Sujets traités : les champignons, étude de la cellule, coupe dans la pelure d'un oignon, racine d'iris, tableau chronologique des terrains sédimentaires, calcaire de Blaye, d'Albi, grès, schiste, quartz, granit, etc. Schémas et dessins relatifs aux sujets traités. Élève en 1ère année d'Ecole Normale d'institutrices.

Mots-clés : Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)

Filière : École normale d'instituteur et d'institutrice

Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé

Commentaire pagination : 41 p. manuscrites sur 100 p.

Langue : Français

Lieux : Albi

Année 1931-32

Histoire Naturelle

Jeanne Roques
I^{re} année



Russule émétique

i) Genre russule

Champignons charnus à chapeau peu élevé souvent déprimé au centre. Pied généralement court - jamais de latic (diff. avec genre latic). En général couleur vive rouge orange et spores blanches.

ii) Variétés: russule emetique

chapeau rouge ~~brun~~ ou foncé et décolorant facilement et devenant par endroits ou même en entier fauve ou blanc 4 à 10 cm

Pied blanc souvent tacheté de rose ou de rouge. Lamelles blanches. Chair blanche rougeâtre sous l'épiderme qui est très facile à détacher, saveur très poivrée commune des bois, etc., automne.

Très vénéneuse

Hypopholome en touffes.

i) Genre hypopholome

De la forme d'un amas formé de filaments grêles et assez espacés l'un de l'autre. Ils se fixent au pied au bord du chapeau. Peut laisser traces sur le pied ou le bord du chapeau mais ce n'est pas toujours visible des latic. Les échantillons âgés sont violacés.

ii) Espèces: hypopholome en touffes

chapeau fauve plus pâle au bord 4-6 cm

ped creux souvent flexueux ou peu recourbé fauve parfois rose ou orange. Lames fauves verdâtres puis vert sale. Chair très amère - espèce commune en grosses touffes sur vieilles souches, trunks d'arbres automne.

- Preschoot.



Cortinaires

I - Genre cortinaire

Très grand nombre d'espèces faciles à reconnaître, ont un aspect comme les hypholomes : cortine formée de filaments grêles lâchement unis entre eux ; ressemble un peu à une toile d'araignée ; de la jeune âge recouvre le pied du chapeau plus tard débris autour du pied ou du chapeau.

Feuilles de couleur variée quand le champignon est jeune (jaune, violet, noir) devient brun foncé.

Grand nombre de cortinaires vénéreux très peu d'espèces comestibles.

Spores jaunes d'ocre.

II - Espèce cortinaire anomal

Chapeau de couleurs diverses suivant les variétés : jaune pâle, bleu, violet rose qui brunit avec l'âge - nombreuses variétés. Commune des bois, sur tout de lièges.