

Règles sanitaires.

Numéro d'inventaire : 2005.02430

Type de document : texte ou document administratif

Date de création : 1910 (vers)

Description : Feuille de papier jauni et taché, quadrillée encre bleue. Nombreuses déchirures sur les bords et le long des pliures. Texte et lignes manuscrits à l'encre noire. Soulignements à l'encre rouge. Mentions au crayon à papier au verso.

Mesures : hauteur : 390 mm ; largeur : 300 mm

Notes : Document relatif aux maladies infantiles et aux mesures d'éloignement de l'école et des autres élèves. Six colonnes: désignation de la maladie (rougeole, scarlatine, coqueluche, varicelle oreillons, diphtérie) / durée de l'incubation / premiers symptômes / période contagieuse / nature de la contagion (mode de transmission) / éloignement de l'école; déclaration, désinfection obligatoires ou non. Etabli soit par un étudiant d'Ecole Normale, soit un instituteur et/ou directeur d'école. La conjecture de date se fonde sur la date de mise au point d'un sérum antidiphérique mentionné dans le document (1894).

Mots-clés : Gestion sanitaire des établissements d'enseignement

Filière : École primaire élémentaire

Niveau : aucun

Autres descriptions : Langue : Français

Export des articles du musée
sous-titre du PDF

Désignation de la maladie	Durée de l'incubation	Premiers symptômes	Période contagieuse	Nature de la contagion	Classement de l'école. Déclaration, désinfection obligatoire ou non.
Rougeole	11 jours	Éternuement. Rhume de cerveau. Gorge rouge et harnayante. Cou rouge, bruyante. Voix rauque. Fièvre modérée. Éruption sur le palais, p. e. plaques blanches sur les gencives. Vers le 2 ^e jour, boutons rouges d'abord sur le front, joues, puis poitrine, bras, jambes.	Tout au long de la période d'incubation	Surtout directe	Éloignement du malade pendant 10 jours à partir du début de la maladie. Classement des frères et sœurs même sains pendant une vingtaine de jours. Eloignement immédiat de l'enfant épidémique, n'ayant pas eu la rougeole. Déclaration et désinfection obligatoire.
Scarlatine	4 à 5 jours	Mal de gorge. Gorge rouge avec taches blanches. Souvent fièvre et vomissements. Vers le 2 ^e jour, plaques rouges d'abord sur le cou, la poitrine, les membres. Période de desquamation.	Pendant toute la durée de la maladie	Directe et indirecte	Éloignement immédiat et isolement pendant 10 jours au moins, + long temps si gorge encore rouge ou desquamation n'aachévé. Eloignement des frères et sœurs même sains. Déclaration et désinfection obligatoires.
Couvelache	11 jours	pdt 8 à 10 jours toux, parfois étrenueuse et expectoration. Puis toux quinteuise, prolongée, bruyante avec suffocation.	Surtout aux débuts	Surtout directe	Éloignement du m. 3 semaines au plus tard que frères et sœurs même sains. Eloignement de l'enfant curable, n'ayant pas eu la couvelache.
Varicelle	12 jours	Couvarture - fièvre, aphé de la bouche. Petits taches rouges surtout sur la tête (face et cuir chevelu) et le tronc. Petits bulles remplies de liquide au milieu de ces taches.	10 jours environ à partir du début.	Directe	Éloignement du malade pendant 10j à partir du début de la maladie (declarée) Déclaration obligatoire.
Oreillons	15 jours	Goufflement rapide aux environs des glandes salivaires (derrière l'oreille et sous le menton). Toux légère	10 jours environ à partir du début	Directe surtout	Éloignement du malade pendant 10j. Surveillance des frères et sœurs surtout si ils n'ont pas eu les oreillons. Eloignement dès les 1 ^{er} symptômes.
Diphthérie		Tort mal de gorge. Toux blanchâtres t. t. au fond ou sur amygdales. Goufflement des ganglions du cou. Fièvre. Cough: voix rauque. Dyspnée. Sore throat. Souvent rhume de cerveau	p. e. incubation; maladie, convalescence et 1 ^{er} après	Directe et indirecte	Éloignement immédiat et isolement du malade pendant 10 jours au moins, + si gorge rouge. Eloignement des frères et sœurs pendant 10j aussi que de l'enfant ayant mal à la gorge (groses jambes). Déclaration et désinfection obligatoires. Sérum anti-diphthérique.