

Buvard publicitaire: Cobaltoxane

Numéro d'inventaire : 2024.21.32

Type de document : buvard

Période de création : 3e quart 20e siècle

Inscriptions:

• inscription concernant le commanditaire : Laboratoire Théranol F. Bonhomme, docteur en pharmacie 35, rue de Paris Clichy (Seine) PEReire 63-27

• marque publicitaire : Cobaltoxane. Complexe quinoléocobaltique contenant 8,93% de Co métal Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. ?2. Suppositoires dosés à 0 gr. 05. Pommade à 5% Hypertension. Traitement d'attaque : 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les jours. Traitement d'entretien : 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les deux jours, un mois sur deux. Artérite oblitérante. 1 injection 1. M. ou un suppositoire tous les deux jours, avec application journalière de pommade. Syndromes vaso-moteurs. a) Maladie de Raynaud, Aérocyanose, Erytro-cyanose sus-malléolaire : 3 à 6 injections 1. M. ou 3 à 6 suppositoires par semaine localement, applications de pommade. b) Engelures : massages journaliers des parties atteintes avec la pommade.

Matériau(x) et technique(s) : papier buvard | impression monochrome

Description : Buvard crème imprimé en bleu. **Mesures** : hauteur : 8,9 cm ; largeur : 20,4 cm

Mots-clés: Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

La publicité et l'enfant

Autres descriptions : Langue : Français



do 2 es. decist à 1 pr. 82
SUPPOSITOIRES
dosés à 0 gs. 05
POMMADE

Complexe quinoléocobaltique contenant 8,93 % de Co métal

Hypertension

Traitement d'attaque : 1 injection l. M. ou un suppositoire tous les jours.

Traitement d'entretten: 1 injection I. H. ou un suppositoire tous les deux jours, un mois sur dem.

REMBOURSÉ S. S.

Artérite oblitérante

1 injection I. M. ou un suppositoire tous les deux jours, avec application journalière de pommade.

LABORATOIRE THÉRANOL

F. BONHOMME, DOCTEUR EN PMARMACIE

35, Rue de Paris CLICHY (Seine)

PERetre 63-27

Syndromes vaso-moteurs

- Maladies de Raynaud, Acro-syanose, Erytrocyanose sus-mailéolaire : 3 à 6 injections I. M. on 3 à 6 suppositoires par semaine et localement, applications de pommade.
- B) Engelures : Massagos journaliers des parties atteintes avec la pommade.

1/1