

## Cahier de biologie

**Numéro d'inventaire :** 2015.8.6229

**Type de document :** travail d'élève

**Période de création :** 4e quart 20e siècle

**Matériaux et technique(s) :** papier encre, crayon Conté

**Description :** Cahier en papier, à la couverture en papier cartonné, à la reliure piquée agrafée. L'ensemble est écrit à l'encre bleue, noire, verte et rouge, avec l'utilisation ponctuelle du crayon à papier.

**Mesures :** hauteur : 29,7 cm ; largeur : 21 cm

**Notes :** Cahier de biologie, sans mention de date ni d'auteur. L'ensemble peut être divisé en deux parties. En effet, le cahier a d'abord servi de livre de compte (pour un débit de boisson ?), et l'on trouve différentes listes de courses, de consommation et d'ardoises. Ensuite, le cahier a été réutilisé pour un cours de biologie, relevant manifestement du niveau lycée (section scientifique). Les chapitres abordés sont les suivants: -Le système nerveux central et périphérique -Les fonctions motrices -L'activité cérébrale. -Les fonctions sensorielles -L'oreille, l'audition, l'équilibration -L'olfaction -La gustation -La peau -Les échances acido-basiques

**Mots-clés :** Sciences naturelles (post-élémentaire et supérieur)

**Utilisation / destination :** matériel scolaire

**Autres descriptions :** Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 56 p.

## le système nerveux central et périphérique

### ① schéma général.

- le nerf est logé dans la cavité crânienne et dans le canal rachidien (moelle épinière) (encéphale)
- le nerf est protégé et nourri par les meninges et le liquide céphalorachidien.
- 2 sortes de centres nerveux:
  - ① le cerveau - le cervelet → 12 paires de nerfs crâniens.  
situés dorsalement, de forme massive et de couleur grise. leur surface présente des circonvolutions.
  - ② le tronc cérébral - la moelle épinière  
situés ventralement, de forme allongée, de couleur blanche. leur surface est lisse.
- tous les centres renferment à la fois de la substance blanche et de la substance grise. Dans les centres gris, la substance blanche est interne. Dans les centres blancs, elle est externe
- des centres blancs sont reliés aux organes par des nerfs → sont des centres inférieurs.

### ② la moelle épinière

- cordon blanc d'1 cm de Ø de 50 cm de longueur
- elle présente des renflements = 2 qui correspondent à l'émergence des membres et se termine en pointe au niveau de la 2<sup>e</sup> vertèbre lombaire.

→ à la moelle épinière sont reliés les nerfs rachidiens: 31 paires  
chaque nerf présente 2 racines → l'une postérieure et sensible  
porte le ganglion spinal  
→ l'autre antérieure et motrice  
est dépourvue de ganglion,  
tous les nerfs rachidiens sont mixtes.

Ils s'unissent souvent en formant des plexus (cervical, lombaire,  
brachial, sacré.)

→ la moelle épinière, en coupe transversale montre 2 régions:

① au centre, la substance grise forme autour du canal  
de l'épendyme une colonne ininterrompue dont la  
section a la forme d'un H bosselé avec des cornes  
antérieures, larges et courtes

• avec des cornes

postérieures, longues et effilées.

• avec des cornes

latérales, à peine épaissies.

→ sur le pourtour, la substance blanche est divisée en 2 moitiés  
symétriques par 3 sillons = des lignes d'émergence des nerfs  
rachidiens divisent chaque moitié en 3 cordons: (antérieur  
latéral  
postérieur)

### ③ le tronc cérébral

- prolongement de la moelle épinière dans la cavité crânienne.  
- formé de 3 parties à l'arrière en avant

① le bulbe rachidien

② la protubérance annulaire = pont de varde

③ les péduncules cérébraux = le mesencéphale

au tronc cérébral sont reliés les nerfs crâniens → 12 paires  
sensitives, motrices ou mixtes.

- le tronc cérébral est creusé d'une cavité, le quatrième ventricule prolongé par 2 canaux → canal de l'épendyme  
→ l'aqueduc de Sylvius  
son tronc présente une déchirure = le trou de Magendie qui permet au liquide céphalorachidien de passer des espaces méninx dans les cavités internes.

~~face dorsale postérieure~~ 4 masses émondées = tubercules quadrigumentaux (vers l'avant)  
~~3 paires de cordons qui l'unissent au cervelet (vers l'arrière)~~  
= péduncules cérébelleux, antérieurs moyens postérieurs

- la coupe du tronc cérébral montre des noyaux gris pris sa région médiane est caractérisée par une substance ni blanche, ni grise = LA FORMATION RETICULÉE

## ④ le cervelet

- masse grise
- comprend un lobe médian étroit = le vermis  
2 hémisphères cérébelleux
- structure = arborisations de substance blanche recouvertes d'une couche de substance grise = le cortex cérébelleux
- 2 noyaux pairs de substance grise → un ds le vermis  
→ 1 ds chaque hémisphère

## ⑤ le cerveau

- partie la + volumineuse de l'encéphale
- formé de 2 hémisphères cérébraux plissés
  - ↳ leur substance blanche est recouverte de substance grise = cortex cérébral gris.
  - ↳ 3 sillons + orientés divisent chaque hémisphère
    - (scissure de Sylvius
    - sillon perpendiculaire
    - sillon de Rolando